

Anwendungsempfehlungen:	PLOCHER-Produkte:	Dosierempfehlungen:
nach der Winterstagnation bis März	plocher schlammabbau	alle 2 Wochen 3 - 5 g/m ²
anschließend bis Juni	plocher stabilisierung	alle 2 Wochen 3 - 5 g/m ² und nach starkem Regen
bei Badetemperaturen	plocher oberflächenwasser	alle 2 Wochen 3 - 5 g/m ² bei starker Belastung empfehlen wir eine häufigere Dosierung
nach der Badesaison	plocher stabilisierung	alle 2 Wochen 3 - 5 g/m ² und nach starkem Regen
anschließend bis zur Winterstagnation	plocher schlammabbau	alle 2 Wochen 3 - 5 g/m ²

Die angegebene Menge in genug Wasser einrühren und mit Hilfe einer **Gießkanne** gleichmäßig über das Gewässer verteilen. Natürlich können Sie bei grösseren Flächen auch mit der **Rückenspritze** einbringen! Eventuell von Vorteil ohne Düsenaufsatz für grosse Distanzen! Bei Wettereinflüsse wie schnelle Temperaturwechsel, Stürme, starke Regenfälle, Pollenflug Herbstlaubeintrag können Veränderungen in der Dosierung erfordern sein. Geben Sie öfter, aber Mengenmässig etwas weniger!