

PLOCHER- Vitalplan: Körner- leguminosen



| EC-Stadien | Nach der Ernte und im Frühjahr | Behandlung Saatgut Körnerleguminosen bzw. Zwischenfrucht | 10 - 20 cm Wuchshöhe | Vor der Blüte |
|---|--|--|--|--|
| <p>PLOCHER-Produkte Anwendungsempfehlungen</p> <p><i>Spritzwassermenge: 200 - 400 l In einem Eimer mit Wasser aufrühren, bei Mischungen immer zuerst PLOCHER-Produkte in die Feldspritze bei laufendem Rührwerk einfüllen.</i></p> | <p>plocher humusboden me (ak 7071) 1 l/ha Ersteinsatz bei Bedarf: 1,5 - 2 l/ha</p> | <p>plocher pflanzen do (ap 3051) 20 g/100 kg</p> | <p>plocher pflanzen do (ap 3051) 200 g/ha</p> <p>plocher blatt-spezial me (ap 3471) 100 ml/ha</p> <p><i>Bei Bedarf:</i> plocher combi-blatt mg (ap 3752) 400 - 600 g/ha</p> | <p>plocher pflanzen do (ap 3051) 200 g/ha</p> <p>plocher blatt-spezial me (ap 3471) 200 ml/ha</p> <p><i>Bei Bedarf:</i> plocher combi-blatt mg (ap 3752) 400 - 600 g/ha</p> |
| Kosten/ha € netto | € 45,38 - 90,76 | € 0,67 | € 6,69 + 3,78 (€ 18,15 - 27,23) | € 6,69 + 7,56 (€ 18,15 - 27,23) |
| <p>Sonstiges Bemerkungen</p> <p><i>Wettereinflüsse, Standort u. a. können Änderungen der Spritzfolge und Dosierung bedingen</i></p> | <p><i>Flächenkompostierung der Ernterückstände.</i></p> <p><i>Kann auch der PLOCHER-Rottegülle (= Flüssighumus) vor dem Ausbringen beigemischt werden.</i></p> | <p><i>Saatgutbehandlung 1 - 3 Tage vorher.</i></p> <p><i>Bei schon gebeiztem Saatgut: Beim Befüllen der Sämaschine dazu mischen.</i></p> | | |



Integrierter Pflanzenbau

Bitte beachten Sie folgende Empfehlungen:

- **plocher agro-kat** für die Feldspritze zur Wasservitalisierung und Wasserhärtestabilisierung
- **Ersteinsatz PLOCHER-Gesamtkonzept: 20 - 30 % Reduzierung von Dünger und Pflanzenschutzmitteln**
- **Bei kontinuierlichem Einsatz der PLOCHER-Produkte weitere sukzessive Reduzierung von Dünger und PSM**
- **Für Umstellungsbetriebe: Einfacher und schneller Übergang zur Öko-Landwirtschaft**

